

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
		<b>F2</b>	
<b>Blinatumomab 28 µg/døgn,3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gjelder for pasienter > 45 kg som får fast dose. Denne syklusen varer i 27 døgn og gis som sammenhengende infusjon.

**Sykepleierinformasjon :**

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 13.04.2026 11:05
<b>Kontrollert av :</b> Siri Asheim Eikeland	<b>Tidspunkt :</b> 22.04.2026 12:59
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bruk 0,2 µm filter

Premedikasjon er gitt. Se støtteinfo

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn,3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (96:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn,3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
12		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (96:00 etter start av linje 1, kurdag 8)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
16		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (96:00 etter start av linje 1, kurdag 12)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
20		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (96:00 etter start av linje 1, kurdag 16)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn,3 døgn x 1+ 4 døgn x 6 (27 døgn) - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
24		1	Blinatumomab 112 µg (standard) (intravenøs infusjon over 96:00) (96:00 etter start av linje 1, kurdag 20)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 2,5 ml/time.

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 13.04.2026 11:05 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 13.04.2026 11:05
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 22.04.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:28