

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 7
<b>F2</b>			
<b>A2G/NOPHO ALL blokk A, &lt; 56 år - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren inneholder intratekal metotreksat/it trippel på dag 1 (avhengig av CNS-status). It mtx er lagt inn i kurdefinisjonen. Dersom det er indikasjon for it trippel, må it mtx utelates og trippel bestilles separat (blod 225).

Det skal gis mesna i forbindelse med syklofosamid, se støtteinfo.

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige pegaspargase, se støtteinformasjon

**Sykepleierinformasjon :**

Ev. premedikasjon, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi

**Protokoll**

ALL Together (A2G)

NOPHO ALL 2008

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 7
			<b>F2</b>

**A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Metotreksat 12 mg (standard) (intratekal injeksjon) (00:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Settes intratekalt av lege.

Pas bør ligge med senket hodeleie i 1 time, deretter vannrett i 1 time

Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

3			Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Antiemetika er gitt

4			Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
5			(00:00 etter stopp av linje 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan erstattes med p.o. væskeinntak

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 7
			<b>F2</b>

### A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2	Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
4	(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan erstattes med p.o. væskeinntak

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 7
			<b>F2</b>

### A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2	Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
4	(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan erstattes med p.o. væskeinntak

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 7
			<b>F2</b>

**A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3			Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
4			(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan erstattes med p.o. væskeinntak

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 7
			<b>F2</b>

### A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2	Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
4	(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan erstattes med p.o. væskeinntak

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 7
			<b>F2</b>

### A2G/NOPHO ALL blokk A, < 56 år - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Infusjonstiden kan forlenges, se støtteinfo

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 11.09.2025 14:15 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 10.03.2026 10:32 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til trombocyttkrav

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:32
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33