

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5			

Legeinformasjon :

Kuren gis til voksne ALL-pasienter (HR) < 46 år som behandles etter A2G-protokollen, eller etter NOPHO ALL 2008-protokollen for pasienter som ikke er inkludert i studien.

Pasienten skal ha intratekal behandling på dag 1 (it mtx/trippel avhengig av CNS-status). It mtx er lagt inn i kuren. Dersom det er indikasjon for trippel, må man utelate it mtx og bestille trippel separat.

Steroid-øyedråper (prednisolon/deksametason) forordnes i MetaVision.

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

Sykepleierinformasjon :

Ev. premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

ALL Together (A2G)

NOPHO ALL 2008

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

--	--

Kurdefinisjon

Kontrollert

ARK NR.
2 av 8

F2

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Metotreksat 12 mg (standard) (intratekal injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes intratekalt av lege.

Pas bør ligge med senket hodeleie i 1 time, deretter vannrett i 1 time

Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Marit Hellebostad

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 10.03.2026 11:19

Tidspunkt : 10.03.2026 11:21

Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
F2			

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2 (08:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (02:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--------

Antiemetika er gitt

3	Cytarabin 2000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

4	Idarubicin 8 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (03:00 etter start av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
F2			

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
F2			

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
			F2

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			F2

A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 8 av 8	F2
A2G/NOPHO ALL blokk C, < 46 år - versjon 0.5					
Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (24:00 etter start av linje 1, kurdag 6)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Infusjonstiden kan forlenges, se støtteinfo

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 04.09.2025 11:07 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 11:59 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Versjon 0.3, 10.03.2026 10:21 / Tove Ingeborg Krogstad :
trombocyttkrav

Versjon 0.4, 10.03.2026 10:29 / Tove Ingeborg Krogstad :
fjernet pros.beskr it mtx

Versjon 0.5, 10.03.2026 11:19 / Tove Ingeborg Krogstad :
trombocyttkrav

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:19
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48