

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
F2			
NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5			

Legeinformasjon :

Kuren gis til voksne ALL-pasienter (HR) 56-65 år som behandles etter aldersjustert Norsk eldreprotokoll. NB! Kuren gis sjelden i denne aldersgruppen!

Pasienten skal ha intratekal behandling på dag 1 (it mtx/trippel avhengig av CNS-status). It mtx er lagt inn i kuren. Dersom det er indikasjon for trippel, må man utelate it mtx og bestille trippel separat.

Deksametason øyedråper forordnes i MetaVision.

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

NOPHO ALL 2008

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
F2			

NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Metotreksat 12 mg (standard) (intratekal injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes intratekalt av lege.

Pas bør ligge med senket hodeleie i 1 time, deretter vannrett i 1 time

Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2 (08:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 (max 80,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--------

Antiemetika er gitt

3	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

4	Idarubicin 8 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 (max 80,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Vekt daglig, se støtteinfo

2	Fludarabin 30 (max 80,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (04:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksistet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
F2			

NOPHO ALL blokk C, 56-65 år - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Infusjonstiden kan forlenges, se støtteinfo

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

Anafylaksiberedskap

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

Antiemetika er gitt

Kommentarer :

Versjon 0.1, 09.09.2025 12:07 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 12:03 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Versjon 0.3, 10.03.2026 10:17 / Tove Ingeborg Krogstad :
Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

Versjon 0.4, 10.03.2026 10:27 / Tove Ingeborg Krogstad :
fjernet pros.beskr it mtx

Versjon 0.5, 27.04.2026 11:15 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til maksdoser

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 27.04.2026 11:15
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 27.04.2026 11:45
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48