

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8	<b>F2</b>
<b>AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5</b>				

**Legeinformasjon :**

Kardiologisk vurdering  
Kuren gis på sentralt venekateter

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinfo

**Diagnose**

Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Eva Britt Valaker Hektner	<b>Tidspunkt :</b> 29.01.2026 22:22
<b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli	<b>Tidspunkt :</b> 29.01.2026 22:25
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 13:49

--	--

<b>Kurdefinisjon</b>	Kontrollert	ARK NR. 2 av 8	<b>F2</b>
----------------------	-------------	-------------------	-----------

**AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

	2	Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
--	---	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

	3	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (01:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
--	---	---	---	--------

Idarubicin og cytarabin går i separate løp

Cytarabin kan gi CNS-toksitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner Kontrollert av : Anne Vestli Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22 Tidspunkt : 29.01.2026 22:25 Dato / klokke : 28.04.2026 13:49
---	--

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

3			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:49

--	--

# Kurdefinisjon

Kontrollert

ARK NR.  
4 av 8

F2

## AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

3			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner  
Kontrollert av : Anne Vestli

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 29.01.2026 22:22

Tidspunkt : 29.01.2026 22:25

Dato / klokke : 28.04.2026 13:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væske: Minimum 2500 mL/døgn. Gi ev. ekstra NaCl iv.

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væske: Minimum 2500 mL/døgn. Gi ev. ekstra NaCl iv.

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væske: Minimum 2500 mL/døgn. Gi ev. ekstra NaCl iv.

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
			<b>F2</b>

### AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3) - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 6)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væske: Minimum 2500 mL/døgn. Gi ev. ekstra NaCl iv.

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 6)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 09.07.2025 13:56 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 15:51 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret kommentarer

Versjon 0.3, 25.08.2025 12:35 / Tove Ingeborg Krogstad :  
rettet kommentarer

Versjon 0.4, 25.08.2025 12:46 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret kommentarer

Versjon 0.5, 29.01.2026 22:22 / Eva Britt Valaker Hektner :  
Lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:22
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:49