

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
<b>AML induksjon, cytara/idarubicin (7+3) CADD Solis - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
Obs tumorlyse.

**Diagnose**

Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 12:04
<b>Kontrollert av :</b> Marit Hellebostad	<b>Tidspunkt :</b> 10.03.2026 12:13
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 13:50

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabid/idarubicin (7+3) CADD Solis - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1 ( 09:00 )		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Daglig vekt, se støtteinfo

2			Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3			Cytarabin 600 (max 1500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 72:00) (01:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek
---	--	--	--	--	--------

Cytarabin gis i separat løp 1 time etter start av idarubicin

Cytarabin kan gi CNS-toksitet, se støtteinfo

Velg kontinuerlig protokoll Cytarabin 72t (dag 1-3)

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:04
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabid/idarubicin (7+3) CADD Solis - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Daglig vekt, se støtteinfo

2			Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:04
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			<b>F2</b>

**AML induksjon, cytarabid/idarubicin (7+3) CADD Solis - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Daglig vekt, se støtteinfo

2		2	Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:04
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
<b>F2</b>			

**AML induksjon, cytarabid/idarubicin (7+3) CADD Solis - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Cytarabin 800 (max 2000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 96:00) (72:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek

Daglig vekt, se støtteinfo

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Velg kontinuerlig protokoll Cytarabin 96t (dag 4-7)

**Kommentarer :**

Versjon 0.2, 30.01.2026 12:04 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:04
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50