

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
F2			
AML induksjon 2, ID cytarabin/dauno 60 mg, CADD Solis - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Pasienten skal være godt hydrert, minst 2000 ml/døgn, hvorav 500 ml i løpet av de siste timene før hver dose cytarabin. Gi ev. 1000 ml NaCl 9 mg/ml som ordineres ved behov.
 Deksametason øyedråper forordnes i MetaVision.
 Cytarabin gis intermitterende med CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Sykepleierinformasjon :

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabin-dose
 Posen med cytarabin inneholder 4 doser, hver dose over 3 timer. Oppstart hver 12. time.
 Posen går tom etter 4 doser, ny pose startes på dag 3 og 5

Diagnose

Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:39
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			F2

AML induksjon 2, ID cytarabin/dauno 60 mg, CADD Solis - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1 (09:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

2		Daunorubicin 60 (max 180,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Startes samtidig med NaCl

Daunorubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3		Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (01:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek
---	--	--	--	--------

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Velg intermitterende protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:39
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
			F2

AML induksjon 2, ID cytarabin/dauno 60 mg, CADD Solis - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2 (09:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

2			Daunorubicin 60 (max 180,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:39
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			F2

AML induksjon 2, ID cytarabin/dauno 60 mg, CADD Solis - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3 (09:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

2		Daunorubicin 60 (max 180,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

3		Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (01:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek
---	--	--	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Velg intermitterende protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:39
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

AML induksjon 2, ID cytarabin/dauno 60 mg, CADD Solis - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5 (10:00)		1	Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Velg intermitterende protokoll

Kommentarer :

Versjon 0.1, 13.11.2025 10:47 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 14.11.2025 10:15 / Tove Ingeborg Krogstad :
Cadd solis

Versjon 0.3, 30.01.2026 12:39 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:39
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:50