

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Pasienten må ha sentralt venekateter, helst tunnelert trippel-lumen Hickman.
 Væskebehov over 2500 mL/døgn. Ordiner 1000 mL NaCl 9 mg/mL ved behov (ved væskeinntak < 2500 mL)

Diagnose

Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:42
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:31
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
F2			

AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post
		2	Daunorubicin 60 (max 150,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Daunorubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

		3	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (00:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:42
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:31
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			F2

AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post
		2	Daunorubicin 60 (max 150,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Gis parallelt med cytarabin i separat løp

Daunorubicin er vevstoksisk

3		Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:42
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:31
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post
		2	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:42
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:31
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
F2			

AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
4		1	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 12:42
<i>Kontrollert av :</i> Marit Hellebostad	<i>Tidspunkt :</i> 10.03.2026 12:31
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 13:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
F2			

AML induksjon påfyll, cytarabin/daunorubicin 60 mg (5+2) - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.09.2025 09:31 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 12:42 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 12:42
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:31
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:51