

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
Gis som konsolideringskur til pasienter > 65 år i CR1

Diagnose

Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
F2			

AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
		2	Mitoksantron 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:20) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mitoksantron er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

		3	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 23:40) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			F2

AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
		2	Mitoksantron 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:20) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mitoksantron er vevstoksisk

		3	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 23:40) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
		2	Mitoksantron 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:20) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mitoksantron er vevstoksisk

3			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 23:40) (24:00 etter stopp av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
F2			

AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(24:00 etter start av linje 3, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
		2	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
			F2

AML konsolidering N3A5, cytarabin/mitoksantron - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
		2	Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 09.07.2025 14:10 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 15:50 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.3, 29.01.2026 22:25 / Eva Britt Valaker Hektner :
Lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:52