

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8	F2
AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4				

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
F2			

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

OBS tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege.

2		Daunorubicin 45 (max 150,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3		Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (01:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Daunorubicin og cytarabin går i separate løp

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
			F2

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Daunorubicin 45 (max 150,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

3			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
			F2

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 2500 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Daunorubicin 45 (max 150,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med cytarabin i separat løp

3			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
F2			

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
			F2

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			F2

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
			F2

AML induksjon, cytarabin/daunorubicin 45 mg (7+3) - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	(24:00 etter start av linje 1, kurdag 6)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 6)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 09.07.2025 13:44 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 15:52 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.3, 26.08.2025 12:04 / Tove Ingeborg Krogstad :
rettet kommentarer

Versjon 0.4, 29.01.2026 22:26 / Eva Britt Valaker Hektner :
Lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:26
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:53