

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
F2			
AML FLAG-Ida cytarabin/fludarabin/idarubicin kur 2 - versjon 0.4			

Legeinformasjon :

Kardiologisk vurdering
 Kuren gis på sentralt venekateter
 Deksametason øyedråper forordnes i MetaVision.

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
 Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:30
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:55

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			F2

AML FLAG-Ida cytarabin/fludarabin/idarubicin kur 2 - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2		Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:05 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

G-CSF er startet dag 0

Antiemetika er gitt

3		Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

4		Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:30
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:55

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
			F2

AML FLAG-Ida cytarabin/fludarabin/idarubicin kur 2 - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:05 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
3	Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Idarubicin er vevstoksisk

4	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:30
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:55

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			F2

AML FLAG-Ida cytarabin/fludarabin/idarubicin kur 2 - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:05 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
3	Idarubicin 12 (max 30,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Idarubicin er vevstoksisk

4	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:30
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:55

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
			F2

AML FLAG-Ida cytarabin/fludarabin/idarubicin kur 2 - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:05 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
3	Cytarabin 2000 (max 5000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 17.06.2025 10:50 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 16:09 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.3, 26.08.2025 12:33 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.4, 29.01.2026 22:29 / Eva Britt Valaker Hektner :
Lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:29
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:30
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:55