

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
HMAS Myelomatose høydose melfalan fase III - versjon 0.4			

Legeinformasjon :

Kondisjoneringskur før reinfusjon av autologe stamceller ved myelomatose, AL-amyloidose, eventuelt POEMS syndrom.
Gis på sentralt venekateter

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.03.2026 14:08
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 19.03.2026 14:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<h1>Kurdefinisjon</h1>	Kontrollert
	ARK NR. 2 av 2
	F2

HMAS Myelomatose høydose melfalan fase III - versjon 0.4

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
Dag -1 (1) (08:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Isbiter brukes som mukosittprofylakse, se støtteinformasjon

Vekt x 2 daglig

2	Melfalan 200 (max 500,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--------

Melfalan har kort holdbarhet

Antiemetika er gitt

3	(00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post
---	--------------------------------	--	------

Ved AL-Amyloidose skal posthydrering administreres over 4 timer.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 25.02.2025 13:53 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 10:53 / Tove Ingeborg Krogstad :
ingen endring

Versjon 0.3, 07.03.2026 10:27 / Tove Ingeborg Krogstad :
lat til legekommantar

Versjon 0.4, 19.03.2026 14:08 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til kommentar-Ved AL-Amyloidose skal posthydrering administreres over 4 timer.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.03.2026 14:08
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 19.03.2026 14:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58