

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 10
AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt myelogen leukemi
Myelodysplastisk syndrom

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -6 (1) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Antiemetika er gitt

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (2) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (3) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (4) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

2		ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (5) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

		2	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	---	--------

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -1 (6) (13:00)		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 10
F2			

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (8)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 9 av 10	F2
AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (10)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 09:26
<i>Kontrollert av :</i> Siri Asheim Eikeland	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 11:15
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:02

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 10 av 10
			F2

AlloTx MAC Flu/treo14/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +6 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

Versjon 0.1, 20.11.2025 12:52 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 09:26 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:26
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:02