

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
Rituksimab 500 mg/m² - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Denne kuren brukes bare ved KLL, i kombinasjon med fludarabin og syklofosamid (FCR). Som kur nr. 1 gis rituksimab i dose 375 mg/m² (felles 037).

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Kronisk lymfatisk leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.11.2025 12:38
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.11.2025 13:03
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

Rituksimab 500 mg/m² - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Rituksimab 500 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Anafylaksiberedskap ved 1. dose

Puls og BT, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

1. dose: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver 30 min til 200 ml/t. Senere doser: 30 min dersom tidligere dose ble gitt uten reaksjon.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 22.05.2025 08:20 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 12.11.2025 12:38 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret infusjonstid

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.11.2025 12:38
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.11.2025 13:03
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05