

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 7
F2			
AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
 Ev. intratekal behandling bestilles separat.
 Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal post-mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Denne kurdefinisjonen inneholder dosestiger og grupper for følgende doseringslinjer :

Kurdøgn	Linje nr	Virkestoff	Dosestige / gruppe	Lokal
1	3	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	NaCl til syklofosamid	<input checked="" type="checkbox"/>
2	3	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	NaCl til syklofosamid	<input checked="" type="checkbox"/>

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
 Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:37
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:36
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 7
			F2

AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (1) (13:00)		1	Kaliumklorid 150 mmol (standard) ; Natriumhydrogenkarbonat 500mmol/l 240 mmol (standard) (intravenøs infusjon over 12:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 3000 ml (Standard)	Post

Bruk ev. "hydreringsvæske standard SA RIKS"

Prehydrering, starter 4 timer før start av syklofosamid

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Hydrering tilsatt: KCl 50 mmol og NaHCO3 80 mmol per 1000 ml

2	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (03:30 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
3	Syklofosamid 60 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Premedikasjon og antiemetika er gitt 1 time før syklo

4	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
5	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (08:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
6	Kaliumklorid 150 mmol (standard) ; Natriumhydrogenkarbonat 500mmol/l 240 mmol (standard) (intravenøs infusjon over 12:00) (12:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 3000 ml (Standard)	Post

Bruk ev. "hydreringsvæske standard SA RIKS"

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Hydrering tilsatt: KCl 50 mmol og NaHCO3 80 mmol per 1000 ml

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:37
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:36
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

<h1>Kurdefinisjon</h1>		Kontrollert	ARK NR. 3 av 7	F2
------------------------	--	-------------	-------------------	-----------

AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (2) (16:30)		1	Kaliumklorid 150 mmol (standard) ; Natriumhydrogenkarbonat 500mmol/l 240 mmol (standard) (intravenøs infusjon over 12:00) (12:00 etter start av linje 6, kurdag 1)	Glukose 50 mg/ml 3000 ml (Standard)	Post

Bruk ev. "hydreringsvæske standard SA RIKS"

Prehydrering, starter 4 timer før start av syklofosamid

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Hydreringen pågår til 20 timer etter siste syklofosamid

Hydrering tilsatt: KCl 50 mmol og NaHCO₃ 80 mmol per 1000 ml

2	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
3	Syklofosamid 60 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:30 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Premedikasjon er gitt 1 time før syklo

4	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
5	Mesna 30 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (08:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
6	Kaliumklorid 150 mmol (standard) ; Natriumhydrogenkarbonat 500mmol/l 240 mmol (standard) (intravenøs infusjon over 12:00) (12:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 3000 ml (Standard)	Post

Bruk ev. "hydreringsvæske standard SA RIKS"

Prehydrering, starter 4 timer før start av syklofosamid

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Hydreringen pågår til 20 timer etter siste syklofosamid

Hydrering tilsatt: KCl 50 mmol og NaHCO₃ 80 mmol per 1000 ml

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:37
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:36
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 7
			F2

AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (5)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 09:37
<i>Kontrollert av :</i> Siri Asheim Eikeland	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 11:36
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:09

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 5 av 7	F2
AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (7)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 09:37
<i>Kontrollert av :</i> Siri Asheim Eikeland	<i>Tidspunkt :</i> 30.01.2026 11:36
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:09

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 6 av 7	F2
AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (10)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:37
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:36
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 7
			F2

AlloTx MAC TBI/syklofosamid/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +11 (15)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Pasienten skal vurderes av lege før mtx gis

Kommentarer :

Versjon 0.1, 20.11.2025 11:15 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 09:37 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:37
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:36
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09