

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 11
F2			
AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Ved overvekt [BMI > 25] doseres busulfan etter justert ideell kroppsvekt
 Busulfan dag -5 tom -3 doseres etter serumkonsentrasjon
 Kuren gis på sentralt venekateter
 Eventuell intratekal metotreksat må bestilles separat, kur felles 055
 Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner og premedikasjon, se støtteinformasjon
 Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
 Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -6 (1) (07:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Antiemetika er gitt

2			Busulfan 3,2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (06:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	--	--	--	--------

Busulfaninfusjonen bør starte kl 13 og være helt avsluttet kl 16 pga konsentrasjonsmålinger

Administreres på hvitt eller blått løp

Krampeprofylakse er adm fra 12 timer før oppstart busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (2) (07:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

		2	Busulfan 0 mg (standard) (intravenøs infusjon over 03:00) (06:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
--	--	---	--	--	--------

Busulfaninfusjonen bør starte kl 13 og være helt avsluttet kl 16 pga konsentrasjonsmålinger

Administreres på hvitt eller blått løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (3) (07:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

		2	Busulfan 0 mg (standard) (intravenøs infusjon over 03:00) (06:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
--	--	---	--	--	--------

Administreres på hvitt eller blått løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (4) (07:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

2			Busulfan 0 mg (standard) (intravenøs infusjon over 03:00) (06:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	--	--	--	--------

Administreres på hvitt eller blått løp

3			ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 20, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 16.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (5) (13:00)		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 11
			F2

AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -1 (6) (13:00)		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 12.03.2026 10:14

Tidspunkt : 12.03.2026 10:39

Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 8 av 11	F2
AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (8)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 9 av 11	F2
AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (10)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 12.03.2026 10:14
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 12.03.2026 10:39
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 10 av 11	F2
AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 12.03.2026 10:14
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 12.03.2026 10:39
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:13

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 11 av 11	F2
AlloTx MAC Flu/Bu4/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.3					
Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +11 (18)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Pasienten skal vurderes av lege før mtx gis.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 04.12.2025 13:28 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 09:44 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Versjon 0.3, 12.03.2026 10:14 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret til standard på 0-dose busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13