

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
<b>F2</b>			
<b>AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5</b>			

**Legeinformasjon :**

Ved overvekt [BMI > 25] doseres busulfan etter justert ideell kroppsvekt  
 Busulfan dag -3 doseres etter serumkonsentrasjon  
 Kuren gis på sentralt venekateter  
 Post-tx cy dag +3 og +4 må bestilles separat, kur blod 161)

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon  
 Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
 Akutt myelogen leukemi  
 Alvorlig aplastisk anemi  
 Hodgkin lymfom  
 Myelodysplastisk syndrom  
 Non-Hodgkin lymfom

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
			<b>F2</b>

**AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -6 (1) ( 09:00 )		1	Syklofosamid 14,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Antiemetika er gitt

2			Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			<b>F2</b>

**AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (2) ( 09:00 )		1	Syklofosfamid 14,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

2		Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			<b>F2</b>

**AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (3) ( 07:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Antiemetika er gitt

2		Busulfan 3,2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (05:00 etter stopp av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	--	--	--------

Busulfaninfusjonen bør starte kl 13 og være helt avsluttet kl 16 pga konsentrasjonsmålinger

Administreres på hvitt eller blått løp

Krampeprofylakse er adm fra 12 timer før oppstart busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
			<b>F2</b>

**AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (4) ( 07:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

		2	Busulfan 0 mg (standard) (intravenøs infusjon over 03:00) (06:00 etter start av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek
--	--	---	--	--	--------

Administreres på hvitt eller blått løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
			<b>F2</b>

### AlloTx Haplo. Intensivert Hopkins Cy/Flu/Bu/TBI - versjon 0.5

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (5) ( 11:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 18.12.2025 13:33 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.01.2026 12:33 / Tove Ingeborg Krogstad :  
ingen endring

Versjon 0.3, 06.03.2026 09:38 / Tove Ingeborg Krogstad :  
tatt bort kommentardag -3

Versjon 0.4, 11.03.2026 08:51 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret klokkeslett

Versjon 0.5, 12.03.2026 10:17 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret til standard på 0-dose busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 10:17
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 10:33
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:13