

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
Bortezomib 1,6/rituksimab Waldenstrøm postind. - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Waldenstrøms makroglobulinemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.11.2025 12:39
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.11.2025 13:19
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
F2			

Bortezomib 1,6/rituksimab Waldenstrøm postind. - versjon 0.3

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
1		1	Bortezomib 1,6 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 12.11.2025 12:39
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 12.11.2025 13:19
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
F2			

Bortezomib 1,6/rituksimab Waldenstrøm postind. - versjon 0.3

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
8		1	Bortezomib 1,6 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (ingen relasjon)	-	Apotek

Settes subkutant på mage eller lår

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 12.11.2025 12:39
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 12.11.2025 13:19
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
F2			

Bortezomib 1,6/rituksimab Waldenstrøm postind. - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Bortezomib 1,6 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

2			Rituksimab 375 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Anafylaksiberedskap ved 1. dose

Puls og BT, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

1. dose: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver 30 min til 200 ml/t. Senere doser: 30 min

Kommentarer :

Versjon 0.1, 21.05.2025 15:07 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 16:14 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret skrivefeil

Versjon 0.3, 12.11.2025 12:39 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret infusjonstid

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.11.2025 12:39
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.11.2025 13:19
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:27