

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 9
<b>AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
Post-tx syklofosamid med mesna må bestilles som egen kur: Blod 161 AlloTx GvHD-profylakse post-tx syklo dag +3, +4.

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Ikke-maligne tilstander  
Sigdcelleanemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 09:32
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 10:58
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -9 (1) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 0,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 04:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -8 (2) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx sykle - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -7 (3) ( 08:00 )		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

2	Tiotepa 10 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (01:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	--	--------

Bruk 0,2 µm filter

Antiemetika er gitt

3	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	---	---	--------

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 9
			<b>F2</b>

### AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -6 (4) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Antiemetika er forordnet

2			Syklofosamid 14,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 9
			<b>F2</b>

### AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (5) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

		2	Syklofosamid 14,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	---	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -4 (6) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 09:32
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 10:58
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx syklo - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -3 (7) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 09:32
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 06.03.2026 10:58
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 9 av 9
			<b>F2</b>

### AlloTx RIC ATG/tio/flu/cy/TBI/post-tx sykle - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (8) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 12.01.2026 09:15 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 06.03.2026 09:32 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til antiemetika dag 3

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:32
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:58
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:29