

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | Kontrollert | ARK NR. 1 av 5 |
| Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 1-2 - versjon 0.3 | | | |

Legeinformasjon :

Deksametason og syklofosamid po forordnes i MetaVision eller via resept
Blodprøve til typing/pretransfusjonsprøve skal være levert før 1. dose.

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Ikke-maligne tilstander
Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

| | |
|---|---|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:15 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:42 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:30 |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | | Kontrollert |
| | | | ARK NR. 2 av 5 |
| F2 | | | |

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 1-2 - versjon 0.3

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 1 | | 1 | Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag) | - | Apotek |

Settes subkutan på mage eller lår

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------|
| 2 | | | Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1) | - | Post |
|---|--|--|---|---|------|

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------|
| 3 | | | Syklofosfamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0) | - | Ekstern |
|---|--|--|---|---|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:15 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:42 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:30 |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | | Kontrollert |
| | | | ARK NR. 3 av 5 |
| F2 | | | |

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 1-2 - versjon 0.3

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 8 | | 1 | Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag) | - | Apotek |

Settes subkutan på mage eller lår

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|
| | | 2 | Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1) | - | Post |
|--|--|---|---|---|------|

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------|
| | | 3 | Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0) | - | Ekstern |
|--|--|---|--|---|---------|

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Anne Vestli

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 22.09.2025 09:15

Tidspunkt : 22.09.2025 09:42

Dato / klokke : 28.04.2026 14:30

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | | Kontrollert |
| | | | ARK NR. 4 av 5 |
| | | | F2 |

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 1-2 - versjon 0.3

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 15 | | 1 | Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag) | - | Apotek |

Settes subkutan på mage eller lår

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|------|
| 2 | | | Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1) | - | Post |
|---|--|--|---|---|------|

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|
| 3 | | | Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0) | - | Ekstern |
|---|--|--|--|---|---------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:15 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:42 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:30 |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | | Kontrollert |
| | | | ARK NR. 5 av 5 |
| F2 | | | |

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 1-2 - versjon 0.3

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 22 | | 1 | Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag) | - | Apotek |

Settes subkutan på mage eller lår

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|
| 2 | | 2 | Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1) | - | Post |
|---|--|---|---|---|------|

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------|
| 3 | | 3 | Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0) | - | Ekstern |
|---|--|---|--|---|---------|

Kommentarer :

Versjon 0.1, 21.05.2025 15:17 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 14:02 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.3, 22.09.2025 09:15 / Tove Ingeborg Krogstad :
Anafylaksiberedskap

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:15 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:42 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:30 |