

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
<b>AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
Deksametason øyedråper og G-CSF forordnes i MetaVision.  
Venetoklaks po forordnes i MetaVision eller via resept

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 31.01.2026 10:54
<b>Kontrollert av :</b> Marit Hellebostad	<b>Tidspunkt :</b> 10.03.2026 12:42
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
<b>F2</b>			

### AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept

Antiemetika er gitt

G-CSF er startet dag 0

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:54
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
<b>F2</b>			

**AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:54
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
<b>F2</b>			

**AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 8 (max 20,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:54
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
<b>F2</b>			

**AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 8 (max 20,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:54
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
			<b>F2</b>

**AML ND ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 8mg/m2 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2		2	Idarubicin 8 (max 20,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3		3	Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 26.01.2026 11:29 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 26.01.2026 11:38 / Tove Ingeborg Krogstad :  
Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept

Versjon 0.3, 31.01.2026 10:54 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:54
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48