

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m2 - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
Deksametason øyedråper og G-CSF forordnes i MetaVision.
Venetoklaks po forordnes i MetaVision eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
			F2

AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept

Antiemetika er gitt

G-CSF er startet dag 0

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			F2

AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 6 (max 15,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
			F2

AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 6 (max 15,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
			F2

AML R/R ind. FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Kommentarer :

Versjon 0.1, 01.02.2026 15:27 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:27
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:48