

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
<b>AML R/R konsol FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m2 - versjon 0.1</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
Deksametason øyedråper og G-CSF forordnes i MetaVision.  
Venetoklaks po forordnes i MetaVision eller via resept

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 01.02.2026 15:29
<b>Kontrollert av :</b> Marit Hellebostad	<b>Tidspunkt :</b> 10.03.2026 12:54
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
			<b>F2</b>

### AML R/R konsol FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m<sup>2</sup> - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept

Antiemetika er gitt

G-CSF er startet dag 0

2			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:29
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:54
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
			<b>F2</b>

**AML R/R konsol FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m<sup>2</sup> - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 6 (max 15,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:29
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:54
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:49

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			<b>F2</b>

**AML R/R konsol FLAG-Ida cytara/fludara/ida 6 mg/m2 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Fludarabin 30 (max 75,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Idarubicin 6 (max 15,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Idarubicin er vevstoksisk

3			Cytarabin 1500 (max 3750,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Starter 4 timer etter start av fludarabin

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 01.02.2026 15:29 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.02.2026 15:29
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 12:54
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:49