

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 1 av 4	F2
Studie REMNANT daratumumab s.c./karfilzomib C3-6 - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Skal også ha deksametason po. Skrives ut på resept, må merkes "Studiemedisin, bare til bruk i klinisk studie"
Når deksa gis på samme dag som daratumumab, inngår dosen som del av premedikasjonen.

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

REMNANT

Studieinformasjon

Studie navn : REMNANT

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.10.2025 15:21
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 21:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
F2			

Studie REMNANT daratumumab s.c./karfilzomib C3-6 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Karfilzomib 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet via resept.

2			Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan studie over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post
---	--	--	--	---	------

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap

Bruk egen studiemedisin merket REMNANT

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.10.2025 15:21
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 21:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:51

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 3 av 4	F2
Studie REMNANT daratumumab s.c./karfilzomib C3-6 - versjon 0.1					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
8		1	Karfilzomib 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.10.2025 15:21
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 21:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:51

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			F2

Studie REMNANT daratumumab s.c./karfilzomib C3-6 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Karfilzomib 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
		2	Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan studie over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post

Settes subkutant på magen

Anafylaksiberedskap

Bruk egen studiemedisin merket REMNANT

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.10.2025 15:21 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.10.2025 15:21
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 21:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:51