

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | Kontrollert | ARK NR. 1 av 2 |
| Compassionate use belantamabmafodotin 2,5 mg/kg - versjon 0.1 | | | |

Legeinformasjon :

Det anbefales bruk av kunstig tårevæske uten konserveringsmiddel x 4-8 daglig fra dag 1 i syklus 1 og gjennom hele behandlingsfasen.

Diagnose

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

| | |
|---|---|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 16.09.2025 13:39 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:49 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:54 |

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Kurdefinisjon | | | Kontrollert |
| | | | ARK NR. 2 av 2 |
| F2 | | | |

Compassionate use belantamabmafodotin 2,5 mg/kg - versjon 0.1

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|---|---|--------------|
| 1 | | 1 | Belantamabmafodotin C.U. 2,5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag) | Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard) | Apotek |

Anafylaksiberedskap

Antiemetika er gitt

Kommentarer :

Versjon 0.1, 16.09.2025 13:39 / Tove Ingeborg Krogstad :

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 16.09.2025 13:39 |
| Kontrollert av : Anne Vestli | Tidspunkt : 22.09.2025 09:49 |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:54 |