



Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 7
AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

-  Kuren kan startes enten om morgenen eller om kvelden.
- Kuren gis på sentralt venekateter
- Pasienten må drikke ca. 2000 mL/døgn, hvorav 500 mL før hver cytarabindose. Hvis ikke må det forordnes iv væske

Sykepleierinformasjon :

-  Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

 Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Hydrering, går parallelt med cytarabin. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Antiemetika og øyedråper er gitt

3			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2	<input type="checkbox"/>	1	(12:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Hydrering, går parallelt med cytarabin. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

3			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3	<input type="checkbox"/>	1	(12:00 etter start av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Hydrering, går parallelt med cytarabin. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 3, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

3			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4	<input type="checkbox"/>	1	Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 3, kurdag 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5	<input type="checkbox"/>	1	Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 2, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 7
			F2

AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6	<input type="checkbox"/>	1	Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 2, kurdag 5)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl


Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

2			Cytarabin 1000 (max 3000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 03:00) (12:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Pasienten skal drikke 500 ml timene før oppstart av hver dose cytarabin

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 27.08.2025 13:55 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 11:03 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:03
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 13:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:14