



<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
<b>F2</b>			
<b>AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+, CADD Solis - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

-  Pasienten skal være godt hydrert, minst 2000 ml/døgn, hvorav 500 ml i løpet av de siste timene før hver dose cytarabin. Gi ev. 1000 ml NaCl 9 mg/ml som ordineres ved behov.  
Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.  
Cytarabin gis intermitterende med CADD Solis over 3 timer hver 12. time

**Sykepleierinformasjon :**

-  Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabin-dose  
Posen med cytarabin inneholder 4 doser, hver dose over 3 timer. Oppstart hver 12. time.  
Posen går tom etter 4 doser, ny pose startes på dag 3 og 5

**Diagnose**


 Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:05
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 14:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
<b>F2</b>			

### AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+, CADD Solis - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1 ( 10:00 )		1	Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Antiemetika er gitt

Velg intermitterende protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:05
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 14:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
<b>F2</b>			

**AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+, CADD Solis - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3 ( 10:00 )	<input type="checkbox"/>	1	Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Velg intermitterende protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:05
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 14:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:13

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			<b>F2</b>

### AML induksjon 2 ID cytarabin, 61 år+, CADD Solis - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5 ( 10:00 )	<input type="checkbox"/>	1	Cytarabin 4000 (max 12000,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 48:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1035 ml (Standard) (Eksakt volum)	Apotek

Cytarabin kan gi CNS-toksisitet, se støtteinfo


Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Pas skal drikke 500 ml mellom hver cytarabindose. Væskeinntak p.o. over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time

Velg intermitterende protokoll

#### Kommentarer :

 Versjon 0.1, 14.11.2025 10:34 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 11:05 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 11:05
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 14:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:13