



Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
Studie MajesTEC-7 DRd dara/len/deks C1-2 - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

-  Blodprøve ad interferens levert før 1. dose.
Lenalidomid og deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept.

Sykepleierinformasjon :

-  Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon.


Diagnose

-  Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

-  MajesTEC-7


Studieinformasjon

-  *Studie navn :* MajesTEC-7

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 24.11.2025 10:00
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 24.11.2025 15:38
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 29.04.2026 10:21

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
F2			

Studie MajesTEC-7 DRd dara/len/deks C1-2 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Daratumumab MajesTEC-7 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose.

NEWS, se støtteinfo

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:00
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:38
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
F2			

Studie MajesTEC-7 DRd dara/len/deks C1-2 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8	<input type="checkbox"/>	1	Daratumumab MajesTEC-7 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Anafylaksiberedskap

Settes subkutan på magen

NEWS, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:00
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:38
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
F2			

Studie MajesTEC-7 DRd dara/len/deks C1-2 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15	<input type="checkbox"/>	1	Daratumumab MajesTEC-7 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på magen

NEWS, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:00
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:38
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

Studie MajesTEC-7 DRd dara/len/deks C1-2 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22	<input type="checkbox"/>	1	Daratumumab MajesTEC-7 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap


NEWS, se støtteinfo

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 24.11.2025 10:00 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:00
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:38
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21