

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 31-03-2021 11:17)

(2^e godkjenning 31-03-2021 12:40)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(7)
<input type="checkbox"/>	1	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	2	023639	TREOSULFAN	1	10000 mg/m ²	N	28000 mg	IV Cyt [fast]	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	3	418615	ATG Kanin (Genzyme)	1	2 mg/kg	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	4	007684	METOTREKSAT	1	15 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Etter kur:



Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt
- Myelodysplastisk syndrom

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	FLUDARABIN	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunndose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	30 mg/m ²	Standardvolum: 100 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Produksjon

Virkestoff: TREOSULFAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt [fast]

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Overflate

Standarddose: 10000 mg/m²

Standardvolum: 0 ml/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Produksjon

Virkestoff: **ATG Kanin (Genzyme)**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X	X	X	
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
X						

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
		X			X	

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 104b AlloTx RIC Flu/treo10/ATG3

Kode: blod 104b Emetogent potensiale: 2

Navn: AlloTx RIC Flu/treo10/ATG3

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	2	TREOSULFAN	1	10000 mg/m ²	IV Cyt [fast]	N	N	
4;5;6;	3	ATG Kanin (Genzyme)	1	2 mg/kg	IV	N	N	
8;	4	METOTREKSAT	1	15 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
10;13;	5	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 15:54) (2^e godkjenning 14-03-2023 15:55)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Dag -6. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl	0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Dag -5. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl	0:00		<input checked="" type="checkbox"/>

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Dag -4. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl	0:00		J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Dag -3. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG		0:00		J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Dag -2. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG		0:00		J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Dag -1. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG		0:00		J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon		0:00		J
<input type="checkbox"/>	10 Alle	Dag +3		0:00		J
<input type="checkbox"/>	13 Alle	Dag + 6		0:00		J

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Dag -6. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 6					000:00 t					
00:01	Fludarabin bør starte klokka 09 og treosulfan kl 14					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:03	Forutsetning for kur: Pas har innlagt flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:05	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl					000:00 t					
00:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:00	Skann kuren, startes minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	TREOSULFAN	10000 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	002:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Treosulfan er vevstoksisk					002:00 t					
08:00	Avslutt kurdag					000:00 t					

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Dag -5. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 5					000:00 t					
00:01	Kurdagen bør starte klokka 09 og treosulfan kl 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:05	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl					000:00 t					
00:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:00	Skann kuren, startes minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	TREOSULFAN	10000 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt [fast]		002:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:01	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Treosulfan er vevstoksisk					002:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Dag -4. Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 4					000:00 t					
00:01	Fludarabin bør starte klokka 09 og treosulfan kl 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:05	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl					000:00 t					
00:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		001:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:00	Skann kuren, startes minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	TREOSULFAN	10000 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt [fast]		002:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:01	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Treosulfan er vevstoksisk					002:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Dag -3. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 3					000:00 t					
00:01	Premedikasjon bør gis klokka 06 og 11, fludarabin kl 09 og ATG kl 12					000:00 t					
00:02	Administrere premed 6 timer før ATG, forordnes i MetaVision (kl 06)					000:00 t					
00:03	Ved trombocytter under 20, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
00:04	Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl					000:00 t					
00:05	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Administrere premed før ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
03:51	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
03:52	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
03:53	ATG administreres på blått løp om mulig					000:00 t					
04:00	Parallellhydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:01	Skann kuren	ATG Kanin (Genzyme)	2 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:02	Gi først testdose 1 ml, observer nøye i 10 min					000:00 t					
04:12	Kontroll av infusjonshastighet					008:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Dag -2. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 2					000:00 t					
00:01	Premedikasjon bør starte (kl 06) og kl 11, fludarabin kl 09 og ATG kl 12					000:00 t					
00:02	Ved tidligere reaksjon, husk premed, forordnes i MetaVision (se støtteinfo)					000:00 t					
00:03	Ved trombocytter under 20, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
00:04	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:45	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:00	Administrere preméd før ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
03:50	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
03:51	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
03:52	ATG administreres på blått løp om mulig					000:00 t					
04:00	Parallellhydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:01	Skann kuren	ATG Kanin (Genzyme)	2 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:02	Kontroll av infusjonshastighet					008:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Dag -1. OBS: Risiko for væskeretensjon ifm ATG

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 1					000:00 t					
00:01	Premedikasjon bør starte klokka 06 (ved tidl reaksjon), kl 11 og ATG kl 12					000:00 t					
00:02	Ved tidligere reaksjon, husk premed, forordnes i MetaVision (se støtteinfo)					000:00 t					
00:03	Ved trombocytter under 20, gi trombocyttkonsentrat før ATG kan startes					000:00 t					
00:05	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
03:00	Administrere premed før ATG, forordnes i MetaVision					000:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:51	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:52	ATG administreres på blått løp om mulig					000:00 t					
03:53	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
03:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Parallellhydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:01	Skann kuren	ATG Kanin (Genzyme)	2 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	008:00 t					
04:02	Kontroll av infusjonshastighet					008:00 t					
12:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 1					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon	METOTREKSAT	15 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 10
Dag +3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 3					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 13

Dag + 6

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 6					000:00 t					
00:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 104b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 31-03-2021 11:17	ANGMA 31-03-2021 12:40
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:54	AG 14-03-2023 15:55