

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-04-2024 13:16)
(2^e godkjenning 12-04-2024 14:22)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	345162	Elotuzumab MAGNETISMM-32	1	10 mg/kg	N		IV Stud MAGNETISMM-32	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

P-ALAT:

 B-Leukocytter:

 B-Trombocytter:

P-Albumin:

 P-Bilirubin:

 P-Kreatinin:

Kalsium:

 B-Nøytrofile granulocytter:

 Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eotuzumab MAGNESTISMM-32
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Stud MAGNETISMM-32
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	10 mg/kg
Metningsdose:	0 mg/kg
Maks. dose pr behandling:	mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 471a MagnetisMM-32 arm B EPd Elotuzumab C1-2

Kode: blod 471a Emetogent potensiale: 0

Navn: MagnetisMM-32 arm B EPd Elotuzumab C1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Elotuzumab MAGNESTISMM-32		1 10 mg/kg	IV Stud MAGNETISMM-32	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-04-2024 11:42) (2^e godkjenning 16-04-2024 11:04)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Premedikasjon gis 1 time før, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Elotuzumab MAGNESTISM-32	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud MAGNETISM-32	000:00 t					
00:11	1. kur, dag 1: 30 ml/t i 30 min, 60 ml/t i 30 min deretter 120 ml/t					000:00 t					
00:12	2. kur og senere: 300 ml/t					000:00 t					
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonsett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Etotuzumab MAGNESTISM-32	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud MAGNETISM-32	000:00 t					
00:11	1. kur, dag 8: 180 ml/t i 30 min deretter 240 ml/t					000:00 t					
00:12	2. kur og senere: 300 ml/t					000:00 t					
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Etotuzumab MAGNESTISM-32	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud MAGNETISM-32	000:00 t	300 ml/t				
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Elotuzumab MAGNESTISM-32	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud MAGNETISM-32	000:00 t	300 ml/t				
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 471a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:22
Administrasjon	0	EVABH 12-04-2024 11:42	mhell 16-04-2024 11:04