

## KURDEFINISJON

Kode: blod 522b

Offisiell kode:

**Skriv ut**

Navn: Q-WILD AML induksjon, cytara/ida (5+2) CADD-Solis ☒ ☐

|                  |  |       |
|------------------|--|-------|
| Info til apotek: |  | Tekst |
|------------------|--|-------|

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling: ☒ Nei ☐ Ja ☐ Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: 1 Kurintervall: 21 Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer: 3

**Fleksibelt antall  
kurser:**

**Version:** 1 (Godkjent 10-04-2025 14:58)

**(2<sup>e</sup> godkjenning 10-04-2025 15:19)**

[illegible]

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

|                          | T | Nr | SNC    | Virkestoff | x pr dag | Dose                  | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte                         | po | 1 pose | Inf-tid    | Vol.    | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise                                                                   |
|--------------------------|---|----|--------|------------|----------|-----------------------|---------------|------------|----------------------------------|----|--------|------------|---------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |   | 3  | 006297 | CYTARABIN  | 1        | 800 mg/m <sup>2</sup> | N             | 2000 mg    | IV Cyt<br>QUANTUM-<br>WILD CS96t | N  | N      | 96 time(r) | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
|                          |   |    |        |            |          |                       |               |            |                                  |    |        |            |         |                       |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 |

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: 

Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: 

Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: 

Tekst

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

Etter kur:Utfør:

Informasjon:Tekst

- Diagnose(2)
- ☐

Akutt myelogen leukemi
- ☐

Akutt myelogen leukemi 2

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: IDARUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 12 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      | X      |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

Matrise:

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 24 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff: CYTARABIN

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t

Tillat endring av grunn-dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 96 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 800 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
|        | X      |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|        |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
|        |        |        |        |        |        |        |

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 522b Q-WILD AML induksjon, cytara/ida (5+2) CADD-Solis

Kode:

blod 522b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/ida (5+2) CADD-Solis

☒

☐

| Dag  | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose                  | Adm-måte                  | po | 1 pose | Adm-tid |
|------|----|------------|----------|-----------------------|---------------------------|----|--------|---------|
| 1;2; | 1  | IDARUBICIN | 1        | 12 mg/m <sup>2</sup>  | IV Cyt QUANTUM-WILD       | N  | N      |         |
| 1;   | 2  | CYTARABIN  | 1        | 200 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t | N  | N      |         |
| 2;   | 3  | CYTARABIN  | 1        | 800 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 02-04-2025 09:26) (2<sup>e</sup> godkjenning 02-04-2025 10:09)

### Administrasjonsdager

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag                                                                    | Info etter behandlingsdag                                                                            | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter  |
|--------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle | Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn | Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 24 timer. Bytte av infusjonspose på dag 2            | 0:00     |                     | <div>J</div> |
| <input type="checkbox"/> | 2   | Alle | Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn | Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra. | 0:00     | N                   | <div>J</div> |

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Dato</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dag 1

**Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn**

| Tidspkt | Adm.punkt                                                       | Virkestoff | Dose                  | Inf-væske                       | Adm-måte                     | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet               |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Forutsetning for kur: Pas har<br>innlagt sentralt venekateter   |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Vekt x 2                                                        |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml<br>iv/døgn                         |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Brukes som skylle før og etter<br>hvert medikament              |            |                       | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:29   | Kontroll av intravenøs tilgang                                  |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:30   | Skann kuren. OBS: Idarubicin<br>er vevstoksisk                  | IDARUBICIN | 12 mg/m <sup>2</sup>  | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml    | IV Cyt QUANTUM-WILD          | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:31   | Kontroll av infusjonshastighet                                  |            |                       |                                 |                              | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:25   | Cytarabin gis i separat løp 1<br>time etter start av idarubicin |            |                       |                                 |                              | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:30   | Skann kuren, gis på CADD<br>Solis                               | CYTARABIN  | 200 mg/m <sup>2</sup> | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml   | IV Cyt QUANTUM-WILD<br>CS24t | 024:00 t     |              |               |         |       |       |

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |



| Tidspkt | Adm.punkt                                                     | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 01:31   | Cytarabin går kontinuerlig over 24 timer på CADD Solis        |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:32   | Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 24 t |            |      |           |          | 024:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:40   | Avslutt kurdagen                                              |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 24 timer. Bytte av infusjonspose på dag 2

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

## Administrasjonsrapport

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <div style="border: 1px solid black; height: 25px; margin-bottom: 5px;"><b>Dato</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Pasientdata</b><br/> Høyde ..... cm<br/> Vekt ..... kg<br/> Overflate ..... m<sup>2</sup> </div> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dag 2

**Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn**

| Tidspkt | Adm.punkt                                                               | Virkestoff | Dose                  | Inf-væske                       | Adm-måte                  | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | Vekt x 2                                                                |            |                       |                                 |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn                                    |            |                       |                                 |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Brukes som skyll før og etter hvert medikament                          |            |                       | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:24   | Kontroll av intravenøs tilgang                                          |            |                       |                                 |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:25   | Idarubicin gis parallelt med cytarabin på separat løp                   |            |                       |                                 |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:30   | Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk                             | IDARUBICIN | 12 mg/m <sup>2</sup>  | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml    | IV Cyt QUANTUM-WILD       | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:31   | Kontroll av infusjonshastighet                                          |            |                       |                                 |                           | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:30   | Skann kuren, gis på CADD Solis                                          | CYTARABIN  | 800 mg/m <sup>2</sup> | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml   | IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t | 096:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:31   | Cytarabin går kontinuerlig over 96 timer på CADD Solis                  |            |                       |                                 |                           | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:32   | Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 96 t (dag 2-5) |            |                       |                                 |                           | 096:00 t     |              |               |         |       |       |

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|-----------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
|---------|-----------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|

01:40

Avslutt kurdagen

000:00 t

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.

| blod 522b      | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 1       | LILST 10-04-2025 14:58 | mhell 10-04-2025 15:19 |
| Administrasjon | 0       | tk 02-04-2025 09:26    | AG 02-04-2025 10:09    |