

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(Godkjent 10-04-2025 15:07)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:27)

Diagnoser[illegible]

3

Velg en antiemetika-protokoll:

AG 02-04-2025 10:43

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Diagnose

(2)

☐

Akutt myelogen leukemi

☐

Akutt myelogen leukemi 2

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 6000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 526c Q-WILD AML konsol Cytara 3gx6 D1-3-5, CADD-Solis

Kode:

blod 526c

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML konsol Cytara 3gx6 D1-3-5, CADD-Solis

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	CYTARABIN		1 6000 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 02-04-2025 09:34) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:43)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl	0:00		J
☐	3	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl	0:00	N	J
☐	5	Alle	Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.		0:00	N	J

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:05	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:06	Vekt x 2					000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD solis	CYTARABIN	6000 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	000:00 t					

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroll av inf.hastighet, velg intermitterende protokoll på CADD-Solis					000:00 t					
01:04	Cytarabinposen går tom etter 2 doser, ny pose startes på dag 3					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					
Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl											

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 3

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:05	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:06	Vekt x 2					000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD solis	CYTARABIN	6000 mg/ml	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	000:00 t					
01:03	Kontroll av inf.hastighet, velg intermitterende protokoll på CADD-Solis					000:00 t					
01:04	Cytarabinposen går tom etter 2 doser, ny pose startes på dag 5					000:00 t					

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
---------	-----------	------------	------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	---------	-------	-------

03:10

Avslutt kurdagen

000:00 t

Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 5

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:05	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:06	Vekt x 2					000:00 t					
00:15	Cytarabin gis intermitterende med CADD Solis					000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:50	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD solis	CYTARABIN	6000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS24t	000:00 t					
01:03	Kontroll av inf.hastighet, velg intermitterende protokoll på CADD-Solis					000:00 t					

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:04	Cytarabinposen går tom etter 2 doser, pumpen kan deretter kobles fra					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 526c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 15:07	mhell 10-04-2025 15:27
Administrasjon	0	tk 02-04-2025 09:34	AG 02-04-2025 10:43