

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 564

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

AlloTx RIC modifisert NCI. Cy/Flu

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

13

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

2

(Godkjent 27-11-2025 11:21)

(2^e godkjenning 27-11-2025 11:24)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
☐		1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	600 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
☐		3	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
☐		4	007684	METOTREKSAT	1	15 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■
☐		5	007684	METOTREKSAT	1	10 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(5)

- Hodgkin lymfom
- Hodgkin lymfom 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av
grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total
infusjonstid:

0 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

600 mg/m²

Metningsdose:

0 mg/m²

Maks. dose pr
behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250 ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Produksjon

Virkestoff: FLUDARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 30 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Produksjon

Virkestoff:

METOTREKSAT

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

4

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

15

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
X						

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Produksjon

Virkestoff:

METOTREKSAT

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

5

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

10

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	
		X			X	

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 564 AlloTx RIC modifisert NCI. Cy/Flu

Kode:

blod 564

Emetogent potensiale: 3

Navn:

AlloTx RIC modifisert NCI. Cy/Flu

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;	1	SYKLOFOSFAMID	1	600 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;4;	3	FLUDARABIN	1	30 mg/m²	IV Cyt	N	N	
8;	4	METOTREKSAT	1	15 mg/m²	IV Cyt	N	N	
10;13;	5	METOTREKSAT	1	10 mg/m²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-11-2025 11:44) (2^e godkjenning 27-11-2025 11:59)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Dag -6. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00		J
☐	2	Alle	Dag -5. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	J

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	3	Alle	Dag -4. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	J
☐	4	Alle	Dag -3. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid	Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid	0:00	N	J
☐	8	Alle	Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon		0:00		J
☐	10	Alle	Dag +3		0:00	N	J
☐	13	Alle	Dag +6		0:00	N	J

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Dag -6. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 6					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pas har innlagt flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:03	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				per os	000:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat		002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Dag -5. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 5					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14))				per os	000:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 3

Dag -4. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 4					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				per os	000:00 t					

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 4

Dag -3. Mesna po gis 2 timer før oppstart syklofosfamid

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 3					000:00 t					
00:01	Mesna kl 10, 14 og 18, hydrering kl 11 og 14, syklo 12 og fludarabin 14					000:00 t					
00:03	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
02:00	MESNA 800 mg po, gis 2 timer før oppstart syklo (kl 10)				per os	000:00 t					
03:00	Prehydrering (kl 11)			500 ml Ringer-acetat	IV	001:00 t					
03:45	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:50	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:00	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	600 mg/m2	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		002:00 t					
04:01	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		001:00 t					
06:01	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
06:02	MESNA 800 mg po, gis 2 timer etter oppstart syklo (kl 14)				IV	000:00 t					
06:03	Posthydrering (kl 14)			1000 ml Ringer-acetat	IV	002:00 t					
10:00	MESNA 800 mg po, gis 6 timer etter oppstart syklo (kl 18)				per os	000:00 t					
10:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Mesna po gis 2 og 6 timer etter oppstart syklofosfamid

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 8

Dag +1. MTX skal administreres 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 1					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon	METOTREKSAT	15 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 10

Dag +3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 3					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 13

Dag +6

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag + 6					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	10 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 564	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 27-11-2025 11:21	mhell 27-11-2025 11:24
Administrasjon	0	tk 27-11-2025 11:44	mhell 27-11-2025 11:59