

KURDEFINISJON

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

[illegible]

Velg en antiemetika-protokoll:

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

☐ Brystkreft

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Epirubicin TroFuse-032

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Stud TroFuse-032

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

90

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff:

Epirubicin TroFuse-032

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

Produksjon

Virkestoff: Syklofosamid TroFuse-032

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Stud TroFuse-032

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 600 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

bryst 110 TroFuse-032 Epirubicin/syklofosamid

Kode:

bryst 110

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TroFuse-032 Epirubicin/syklofosamid

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Epirubicin TroFuse-032	1	90 mg/m²	IV Cyt Stud TroFuse-032	N	N	
1;	2	Syklofosamid TroFuse-032	1	600 mg/m²	IV Cyt Stud TroFuse-032	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-02-2026 12:58) (2^e godkjenning 24-02-2026 13:29)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Gis ETTER pembro ved kombinasjonsbehandling	G-CSF 24-72 timer etter kur	0:00		J

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Gis ETTER pembro ved kombinasjonsbehandling

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Epirubicin er vevstoksisk	Epirubicin TroFuse-032	90 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud TroFuse-032	000:05 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:15	Skann kuren	Syklofosamid TroFuse-032	600 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud TroFuse-032	000:10 t					
00:25	Avslutt kurdagen					000:00 t					

G-CSF 24-72 timer etter kur

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

bryst 110	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 24-02-2026 12:44	mhell 24-02-2026 12:58
Administrasjon	0	tk 24-02-2026 12:58	mhell 24-02-2026 13:29