

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 3
Studie DSEE-CRC FLIRI fluorouracil/irinotekan/kalsiumfolinat - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

DPYD analyse anbefales før kurstart.

Diagnose

Endetarmskreft

Tykkarmkreft

Protokoll

DSEE-CRC

Studieinformasjon

Studie navn : DSEE-CRC

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 11:51
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 23.02.2026 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:22

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 3
			F2

Studie DSEE-CRC FLIRI fluorouracil/irinotekan/kalsiumfolinat - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Atropin 0,25 mg (standard) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Post

Settes s.c. 5 min før start av irinotekan

2			Irinotekan 180 mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:05 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Antiemetika er gitt

1. dose 1 time, senere doser 30 min, dersom ingen reaksjon tidligere

3			Fluorouracil 500 mg (overflate) (intravenøs studie over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek
4			(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post

Skyll i 20 min før start av kalsiumfolinat

5			Kalsiumfolinat 100 mg (standard) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:20 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
---	--	--	--	---	------

Gis 20-30 min etter fluorouracil

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 11:51
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 23.02.2026 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:22

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 3
			F2

Studie DSEE-CRC FLIRI fluorouracil/irinotekan/kalsiumfolinat - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fluorouracil 500 mg (overflate) (intravenøs studie over 00:05) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek

Starter 20-25 timer etter fluorouracil dag 1

2			(00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
---	--	--	--------------------------------	---	------

Skyll i 20 min før start av kalsiumfolinat

3			Kalsiumfolinat 100 mg (standard) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:20 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Post
---	--	--	--	---	------

Gis 20-30 min etter fluorouracil

Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.02.2026 11:51 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 11:51
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 23.02.2026 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:22