

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
Studie DSEE-CRC cetuksimab 500 mg/m² - versjon 0.1			

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Endetarmskreft

Tykkarmkreft

Protokoll

DSEE-CRC

Studieinformasjon

Studie navn : DSEE-CRC

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 12:22
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.02.2026 13:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:28

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
			F2

Studie DSEE-CRC cetuksimab 500 mg/m² - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Cetuksimab 500 mg (overflate) (intravenøs studie over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap ved 1. og 2. dose

Puls, BT og temp, se støtteinfo

Obs. tid etter avsluttet infusjon: 1. dose 1 time, 2. og 3. dose 30 min.

Observasjonstid (før ev.kjemo)1. dose: 1 time, 2. dose: 30 min

Premedikasjon er gitt

Infusjonshastighet 1. dose: Maks 300 mg cetuksimab per time, senere doser: maks 600 mg/time

Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.02.2026 12:22 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 12:22
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.02.2026 13:01
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:28