

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
<b>Studie DSEE-CRC epirubicin 40 mg - versjon 0.1</b>			

**Diagnose**

Endetarmskreft  
Tykktarmskreft

**Protokoll**

DSEE-CRC

**Studieinformasjon**

Studie navn : DSEE-CRC

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 19.02.2026 12:13
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 24.02.2026 11:27
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 15.04.2026 14:44

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
<b>F2</b>			

**Studie DSEE-CRC epirubicin 40 mg - versjon 0.1**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
1		1	Epirubicin 40 mg (standard) (intravenøs studie over 00:05) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Epirubicin er vevstoksisk. Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle

Antiemetika er gitt

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 19.02.2026 12:13 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 12:13
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.02.2026 11:27
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:44