

KURDEFINISJON

(2^e godkjenning 30-10-2025 13:09)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
	1	876589	Gemcitabin RAINFOL- OV2		1	800 mg/m²	N		IV Cyt Stud RAINFOL- OV2	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Blodprøver før:

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Kreft i eggstokk
- ☐

Kreft i eggstokk 2

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Gemcitabin RAINFOL-OV2

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Stud RAINFOL-OV2

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

800

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff:

Gemcitabin RAINFOL-OV2

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

500

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 139 RAINFOL-OV2 Gemcitabin

Kode:

gyn 139

Emetogent potensiale: 0

Navn:

RAINFOL-OV2 Gemcitabin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;	1	Gemcitabin RAINFOL-OV2		1 800 mg/m²	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 29-10-2025 14:11) (2^e godkjenning 29-10-2025 15:22)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	8	Alle			0:00	N	J
☐	15	Alle			0:00	N	J

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Gemcitabin RAINFOL-OV2	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Gemcitabin RAINFOL-OV2	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Gemcitabin RAINFOL-OV2	800 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud RAINFOL-OV2	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 139	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 30-10-2025 11:02	mhell 30-10-2025 13:09
Administrasjon	0	tk 29-10-2025 14:11	AG 29-10-2025 15:22