

KURDEFINISJON

(2^e godkjenning 15-01-2026 14:15)

[illegible]

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

 (2)

☐ Kreft i livmorlegeme

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

	Diagnose	(2)
	Kreft i livmorlegeme 2	

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab MK-2870-033

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

400

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag
X												
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag
Dag 29	Dag 30	Dag 31	Dag 32	Dag 33	Dag 34	Dag 35	Dag 36	Dag 37	Dag 38	Dag 39	Dag 40	Dag

Matrise:

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Produksjon

Virkestoff:

Sac-TMT MK-2870-033

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Oyt Studie MK-2870-033

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Kategori:

Ingen

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Vekt

Volum pr:

Fast

Standarddose:

4

mg/kg

Standardvolum:

100

ml

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12
X											
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26
X											
Dag 29	Dag 30	Dag 31	Dag 32	Dag 33	Dag 34	Dag 35	Dag 36	Dag 37	Dag 38	Dag 39	Dag 40
X											

Matrise:

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

gyn 141a TroFuse-033 Pembrolizumab 400 mg + Sac-TMT

Kode:

gyn 141a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

TroFuse-033 Pembrolizumab 400 mg + Sac-TMT

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab MK-2870-033	1	400 mg	IV Studie MK-2870-033	N	N	
1;15;29;	2	Sac-TMT MK-2870-033	1	4 mg/kg	IV Cyt Studie MK-2870-033	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-01-2026 09:38) (2^e godkjenning 15-01-2026 14:14)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Premedikasjon tas 90 min før sac-TMT, se støtteinfo		0:00		J
☐	15	Alle	Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo		0:00	N	J
☐	29	Alle	Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo		0:00	N	J

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1 Premedikasjon tas 90 min før sac-TMT, se støtteinfo
--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Premedikasjon tas 90 min før sac-TMT, dolumenter tidspunkt					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for hvert medikament					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab MK-2870-033	400 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie MK-2870-033	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Observasjonstid: 30 min før start av sac-TMT					000:00 t					
00:41	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele Sac-TMT-infusjonen					000:00 t					

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Bytt til nytt infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
01:02	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:05	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig					000:00 t					
01:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
01:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					
01:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
01:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
03:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
03:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15 Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo
--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 90 min før sac-TMT, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:01	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:07	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
02:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 29

Premedikasjon tas 90 minutter før kur, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 90 min før sac-TMT, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:01	Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele Sac-TMT-infusjonen					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:07	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min, dokumenter tidspunkt					000:00 t					
00:09	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	Sac-TMT MK-2870-033	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie MK-2870-033	001:30 t					
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:00	Observasjonstid 1-4 kur: 60 min, senere kurer: 30 min					000:00 t					
02:01	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

gyn 141a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-01-2026 09:49	mhell 15-01-2026 14:15
Administrasjon	0	tk 15-01-2026 09:38	mhell 15-01-2026 14:14