

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
F2			
Studie TroFuse-021 sacituzumabtirumotekan - versjon 0.1			

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Eggstokkreft

Protokoll

TroFuse-021

Studieinformasjon

Studie navn : TroFuse-021

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 11:19
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 14:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
F2			

Studie TroFuse-021 sacituzumabtirumotekan - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Sacituzumabtirumotekan TroFuse-021 4 mg (vekt) (intravenøs studie over 01:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid 1.-4. dose: 1 time, 5. dose og senere: 30 min

Infusjonstid 1.-4. dose: 90 min, senere doser: 60 min

Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 11:19
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 14:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
			F2

Studie TroFuse-021 sacituzumabtirumotekan - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Sacituzumabtirumotekan TroFuse-021 4 mg (vekt) (intravenøs studie over 01:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid 1.-4. dose: 1 time, 5. dose og senere: 30 min

Infusjonstid 1.-4. dose: 90 min, senere doser: 60 min

Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 11:19
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 14:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:14

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			F2

Studie TroFuse-021 sacituzumabtirumotekan - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
29		1	Sacituzumabtirumotekan TroFuse-021 4 mg (vekt) (intravenøs studie over 01:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid 1.-4. dose: 1 time, 5. dose og senere: 30 min

Infusjonstid 1.-4. dose: 90 min, senere doser: 60 min

Pas skal ha isbiter i munnen 30 min før og under hele infusjonen

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Kommentarer :

Versjon 0.1, 12.03.2026 11:19 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 12.03.2026 11:19
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 12.03.2026 14:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:14