

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 06-10-2022 10:02)

(2^e godkjenning 06-10-2022 10:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	022222	RITUKSIMAB (sc) 1400 mg	1	1400 mg	N		SC Post	J	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	049700	VINKRISTIN	1	0.4 mg/m ²	N	0.5 mg	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	2	021296	ETOPOSID	1	Kat. vekt	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	040053	DOKSORUBICIN	1	10 mg/m ²	N		IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<input type="checkbox"/>	3	050903	SYKLOFOSFAMD	1	750 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet:

3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmentilstand før hver kur:

Etter kur:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(5)

Hodgkin lymfom

Hodgkin lymfom 2

Ikke angitt

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: RTUKSIMAB (sc) 1400 mg

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Post

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Ja

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Oyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Produksjon

Virkestoff: ETOPOSID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt 3F CADD-SOLIS

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra: 0 til: 100 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 50 mg/m²

Standardvolum: 500 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

Vekt fra: 100 til: 200 kg

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 50 mg/m²

Standardvolum: 1000 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Produksjon

Virkestoff: **DOKSORUBICIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3F CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 750 mg/m²

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 039a EPOCH/rituksimab sc, grunndose

Kode: lymfom 039a Emetogent potensiale: 3

Navn: EPOCH/rituksimab sc, grunndose

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	RITUKSIMAB (sc) 1400 mg	1	1400 mg	SC Post	J	N	
1;2;3;4;	2	VINKRISTIN	1	0.4 mg/m ²	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	2	ETOPOSID	1	Kat. vekt	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
1;2;3;4;	2	DOKSORUBICIN	1	10 mg/m ²	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	N	N	
5;	3	SYKLOFOSFAMID	1	750 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-10-2022 09:59) (2^e godkjenning 06-10-2022 10:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m ² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig i tilsammen 96 timer	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m² po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					00:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:02	Forutsetning fra kur: Premedikasjon 1 time før rituksimab					00:00 t					
00:06	Puls og BT før rituksimab					00:00 t					
00:08	Dosekontroll av rituksimab 1400 mg					00:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subcutant i magen	RITUKSIMAB (sc) 1400 mg	1400 mg	11,7 ml	SC post	00:05 t					
00:11	Observasjonstid 15 min etter injeksjon					00:00 t					
00:15	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		00:00 t					
00:18	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:30	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		ETOPOSID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		DOKSORUBICIN	10 mg/m ²	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
05:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:18	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		ETOPOSID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		DOKSORUBICIN	10 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
05:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:18	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		ETOPOSID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		DOKSORUBICIN	10 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
05:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:18	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	KOMBINASJONSKUR Skann kuren x 3	VINKRISTIN	0.4 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		ETOPOSID	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
00:30		DOKSORUBICIN	10 mg/m2	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt 3F CADD-SOLIS	023:00 t					
01:01	Kontroll av infusjonshastighet					023:00 t					
05:00	Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig over 96 timer. Ny pose hver 24 t.

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 5

Skal i tillegg ha prednisolon 60 mg/m2 po fordelt på 2 doser dag 1 - 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:18	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
02:30	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	750 mg/m2	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Kombinasjonskuren pågår kontinuerlig i tilsammen 96 timer

lymfom 039a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	elmib 06-10-2022 10:02	mhell 06-10-2022 10:02
Administrasjon	0	tk 06-10-2022 09:59	mhell 06-10-2022 10:03