

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-05-2023 10:52)
(2^e godkjenning 16-05-2023 10:54)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	062233	GLOFITAMAB C.U.	1	30 mg	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom 2

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	GLOFTAMAB C.U.	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Compassionate Use	X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Volum pr:	Fast							
Fast dose:	30 mg							
Standardvolum:	100 ml							
Maks. dose pr behandling:								

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: lymfom 227 Compassionate use Glofitamab syklus 2+

Kode: lymfom 227 Emetogent potensiale: 0

Navn: Compassionate use Glofitamab syklus 2+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	GLOFITAMAB C.U.		1 30 mg IV	Compassionate Use	N	N	
----	---	-----------------	--	------------	-------------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-05-2023 10:47) (2^e godkjenning 16-05-2023 10:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon skal gis 60 min før start, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	NEWS før infusjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GLOFTAMAB C.U.	30 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	000:00 t					
00:11	Første dose med 30 mg: Infusjonstid 4 timer, deretter 2 timer					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:15	NEWS ved avsluttet infusjon					000:00 t					

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:16	Observasjonstid alle infusjoner: 90 min etter avsluttet glofitamab					000:00 t					
03:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

lymfom 227	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-05-2023 10:52	mhell 16-05-2023 10:54
Administrasjon	0	tk 16-05-2023 10:47	mhell 16-05-2023 10:49