

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 275a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 1. kur

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

7

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 18-10-2023 12:37)

(2^e godkjenning 18-10-2023 12:56)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		0	996215	Cetuksimab SGNTUC-029	1	400 mg/m ²	N		IV Studie SGNTUC-029	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(4)
- ☐

 Kreft i endetarm
- ☐

 Kreft i endetarm 2

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

Diagnose

(4)

☐

Kreft i tykktarm

☐

Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Cetuximab SGNTUC-029

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie SGNTUC-029

Tillat endring av
grunn-dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0 t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400 mg/m²

Metningsdose:

0 mg/m²

Maks. dose pr
behandling:

mg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

500 ml

Matrise:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 275a MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 1. kur

Kode:

mage-tarm 275a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 1. kur

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Cetuksimab SGNTUC-029		1 400 mg/m ² IV Studie SGNTUC-029	N	N		

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-10-2023 14:21) (2^e godkjenning 18-10-2023 14:53)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		J

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cetuksimab gis FØR ev. kjemoterapi					000:00 t					
00:01	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Puls, BT og temp før start, etter 10, 30, 60, 120 og 180 min					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Cetuksimab SGTUC-029	400 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie SGTUC-029	002:00 t					
00:11	OBS Infusjonshastighet! Maks 300 mg cetuksimab per time					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:10	Observasjonstid: 1 time etter avsluttet cetuksimab før ev. kjemoterapi					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 275a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:37	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:21	AG 18-10-2023 14:53