

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(Godkjent 24-06-2025 10:50)

(2^e godkjenning 24-06-2025 12:37)

Matrise

Matrix														
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

mage-tarm 309

Versjon

Godkjent 1

Godkjent 2

Kurdefinisjon

1

LIMOS 24-06-2025 10:50

AG 24-06-2025 12:37

Administrasjon0tk 23-06-2025 11:22

AG 24-06-2025 12:43

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

- ☐ Kreft i endetarm
- ☒ Kreft i endetarm 2
- ☐ Kreft i tykktarm
- ☒ Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: IRINOTEKAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 165 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Produksjon

Virkestoff: KALSIMUMFOLINAT

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 85 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV cyt inf 48t

Tillat endring av grunnpose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

4

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

3200

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 309 OPTIMISE, FOLFOXIRI

Kode:

mage-tarm 309

Emetogent potensiale: 3

Navn:

OPTIMISE, FOLFOXIRI

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	IRINOTEKAN	1	165 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;	2	KALSIMUMFOLINAT	1	200 mg/m²	IV	N	N	
1;	2	OKSALIPLATIN	1	85 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	3200 mg/m²	IV cyt inf 48t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-06-2025 11:22) (2^e godkjenning 24-06-2025 12:43)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Bruk 2 infusjonspumper	Pas møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe. G-CSF bør vurderes etter kur.	0:00	J

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Bruk 2 infusjonspumper

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pasienten skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Brukes som skyll før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Dosekontroll av atropin					000:00 t					
00:11	Atropin 0,25 mg sc 5 min før irinotekan					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	165 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:00 t					
00:16	Infusjonstid: 1. dose 1 time, senere doser 30 min					000:00 t					
00:17	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Skann kuren, startes samtidig med oksaliplatin	KALSIMUMFOLINAT	200 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	002:00 t					
01:00	Skann kuren, startes samtidig med kalsiumfolinat	OKSALIPLATIN	85 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
01:01	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
01:03	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
01:30	Skann kuren	FLUOROURACIL	3200 mg/m ²	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt inf 48t	048:00 t					
01:31	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pas møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe. G-CSF bør vurderes etter kur.

mage-tarm 309	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:50	AG 24-06-2025 12:37
Administrasjon	0	tk 23-06-2025 11:22	AG 24-06-2025 12:43