

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 25-01-2022 12:59)

(2^e godkjenning 25-01-2022 13:11)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	15 µg/m ²	N	28 µg	I/vbam 15µg/m2 10ml/t 24t	N	N	24 time(r)	240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	M/barn 15µg/m2 10ml/t 24t	X	X	X	X	X	X	X
Tillat endring av grunnpose:	Nei							
po:	Nei							
Kategori:	Ingen							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	24 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	15 µg/m ²							
Standardvolum:	240 ml							
Metningsdose:	0 µg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	µg							

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 061a Blinatumomab 15 µg/m2/døgn, 7 døgn, under 45 kg

Kode: ped ALL 061a Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 15 µg/m2/døgn, 7 døgn, under 45 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;6;7;	1	BLINATUMOMAB		1 15 µg/m ²	IVbarn 15µg/m2 10ml/t	24t	N	N

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 09:52) (2^e godkjenning 30-08-2022 10:09)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:07	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:20	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 2. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 3. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 4. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 5. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:55	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 6. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	15 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	I/barn 15µg/m ² 10ml/t 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 061a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 25-01-2022 12:59	AG 25-01-2022 13:11
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 09:52	AG 30-08-2022 10:09