

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

ped ALL 061f

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Blinatumomab 15 µg/m2/døgn,3 døgn x 4,under 45 kg

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

12

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 14-02-2025 17:20)

(2^e godkjenning 18-02-2025 09:33)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
☐	1	100167	BLINATUMOMAB	1	45 µg/m ²	N	84 µg	IV 15 µg/m2 3.3 ml/t 72t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ ■ _ _ _ ■ _ _ _ ■ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Diagnose

(3)

- ☐ Akutt lymfoblastisk leukemi
- ☐ Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- ☐ Ikke angitt

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: BLINATUMOMAB

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV 15 µg/m2 3.3 ml/t 72t

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Virkestoff: BLINATUMOMAB

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 45 µg/m²

Metningsdose: 0 µg/m²

Maks. dose pr behandling: µg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 240 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12		
		X				

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

ped ALL 061f Blinatumomab 15 µg/m2/døgn,3 døgn x 4,under 45 kg

Kode:

ped ALL 061f

Emetogent potensiale: 2

Navn:

Blinatumomab 15 µg/m2/døgn,3 døgn x 4,under 45 kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;4;7;10;	1	BLINATUMOMAB		1 45 µg/m² IV	15 µg/m2 3.3 ml/t 72t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-02-2025 13:26) (2^e godkjenning 13-02-2025 13:04)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		J
☐	4	Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		J
☐	7	Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	J
☐	10	Alle	Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	J

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:06	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:52	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	45 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV 15 µg/m ² 3.3 ml/t 72t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					000:00 t	3.33 ml/t				
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 4

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 72 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	45 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV 15 µg/m ² 3.3 ml/t 72t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3.33 ml/t					000:00 t	3.33 ml/t				

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 7

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 72 timer etter start dag 4. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	45 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV 15 µg/m ² 3.3 ml/t 72t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3.33 ml/t					000:00 t	3.33 ml/t				

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 10

Ev. hydrering doseres individuelt. Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 72 timer etter start dag 7. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	45 µg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV 15 µg/m ² 3.3 ml/t 72t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3.33 ml/t					000:00 t	3.33 ml/t				

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 061f	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 14-02-2025 17:20	mhell 18-02-2025 09:33
Administrasjon	0	tk 06-02-2025 13:26	mhell 13-02-2025 13:04