

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-02-2022 12:10)

(2^e godkjenning 09-02-2022 14:08)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	658758	Blinatumomab A2G1	1	28 µg	N		IV StudieALLTogether1 24t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Ja P-Kreatinin: Ja
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Diagnose**(2)** Akutt lymfoblastisk leukemi Akutt lymfoblastisk leukemi 2

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Blinatumomab A2G1	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV StudieALLTogether1 24t	X	X	X	X	X	X	X
Tillat endring av grunnpose:	Nei							
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Volum pr:	Fast							
Fast dose:	28 µg							
Standardvolum:	240 ml							
Maks. dose pr behandling:								

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 112a A2G Down Blinatumomab, 28 µg/døgn, 7 døgn, 45 kg+

Kode: ped ALL 112a Emetogent potensiale: 2

Navn: A2G Down Blinatumomab, 28 µg/døgn, 7 døgn, 45 kg+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;6;7;	1	Blinatumomab A2G1		1 28 µg	IV StudieALLTogether1 24t	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 10:02) (2^e godkjenning 30-08-2022 10:12)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:54	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Gis på PCA CADD smertepumpe, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 2. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 3. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 4. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 5. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroll av pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo. - les nøye!)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 24 timer etter start dag 6. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	28 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 24t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	10 ml/t				

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

ped ALL 112a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12