

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-02-2022 12:10)

(2^e godkjenning 09-02-2022 14:08)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	658758	Blinatumomab A2G1	1	56 µg	N		IV StudieALLTogether1 48t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ ■ _ ■ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Diagnose**(2)** Akutt lymfoblastisk leukemi Akutt lymfoblastisk leukemi 2

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Blinatumomab A2G1	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6
Adm-måte:	IV StudieALLTogether1 48t		X		X		X	
Tillat endring av grunnpose:	Nei							
po:	Nei	Kategori:	Ingen					
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast					
Fast dose:	56 µg	Standardvolum:	240 ml					
Maks. dose pr behandling:								

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 112c A2G Down Blinatumomab, 28 µg/døgn, 3 x 2 døgn

Kode: ped ALL 112c Emetogent potensiale: 2

Navn: A2G Down Blinatumomab, 28 µg/døgn, 3 x 2 døgn

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	Blinatumomab A2G1		1 56 µg	IV StudieALLTogether1 48t	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 10:02) (2^e godkjenning 30-08-2022 10:12)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.	Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.	Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.	Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har innlagt flerlumen sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision					000:00 t					
00:06	Premed 30 min før start av doseøkning, se MetaVision					000:00 t					
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:19	Still kassettvolumet inn på 240 ml					000:00 t					

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:53	Merk lumen hvor blinatumomab infunderes					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	56 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 48t	048:00 t	5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	5 ml/t				
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 48 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	56 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 48t	048:00 t	5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	5 ml/t				

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye)					000:00 t					
00:12	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:15	Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte					000:00 t					
00:19	Still kassetvolumet inn på 240 ml					000:00 t					
00:42	Infusjonspose byttes 48 timer etter start dag 3. Restvolum kasseres.					000:00 t					
01:00	Skann kuren	Blinatumomab A2G1	56 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV StudieALLTogether1 48t	048:00 t	5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t	5 ml/t				

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t					000:00 t					
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger.					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

ped ALL 112c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 09-02-2022 12:10	AG 09-02-2022 14:08
Administrasjon	0	ANNMO 30-08-2022 10:02	AG 30-08-2022 10:12