

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-02-2022 14:39)

(2^e godkjenning 08-02-2022 14:50)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise | (3) |
|--------------------------|----|--------|--------------|----------|-------|---------------|------------|----------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 100167 | BLINATUMOMAB | 1 | 56 µg | N | | IV Blinatumumab 48 t | N | N | | 240 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ _ ■ _ ■ _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Virkestoff: | BLINATUMOMAB | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Matrise: | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 |
| Adm-måte: | IV Blinatumumab 48 t | | X | | X | | X | |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei | | | | | | | |
| po: | Nei | Kategori: | Ingen | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei | | | | | | | |
| x pr dag: | 1daglig | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Fast dose | Volum pr: | Fast | | | | | |
| Fast dose: | 56 µg | Standardvolum: | 240 ml | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | | | | | | | | |

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 127c Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose, 2 døgnx3, 45kg+

Kode: ped ALL 127c Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/døgn fast dose, 2 døgnx3, 45kg+

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|--------|----|--------------|----------|------------|-------------------|----|--------|---------|
| 1;3;5; | 1 | BLINATUMOMAB | | 1 56 µg IV | Blinatumumab 48 t | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2022 10:03) (2^e godkjenning 30-08-2022 10:13)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|---|--|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp. | Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres. | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp. | Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres. | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Alle Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp. | Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres. | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Pas har fungerende flerlumen sentralt venekateter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Ev. premed 6-12 t før 1. dose blinatumomab i hver syklus, se støtteinfo | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Premed 30 min før start av 1. dose blinatu i hver syklus, se MetaVision | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Premed 30 min før start av doseøkning, se Meta Vision | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:12 | Bruk sett med 0,2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:15 | OBS: Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:19 | Still kassettvolumet inn på 240 ml | | | | | 000:00 t | | | | | |

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|--------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:52 | Merk lumen hvor blinatumomab infunderes | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:00 | Skann kuren | BLINATUMOMAB | 56 µg | 240 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Blinatumumab 48 t | 048:00 t | 5 ml/t | 240 ml | | | |
| 01:01 | Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK | | | | | 000:00 t | 5 ml/t | | | | |
| 01:02 | Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:03 | Kontroller alle pumpeinnstillinger | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:04 | Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 3

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|--------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:10 | CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:12 | Bruk sett med 0,2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:15 | Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:19 | Still kassettvolumet inn på 240 ml | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:55 | Infusjonsposen byttes 48 timer etter start dag 1. Restvolum kasseres. | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:00 | Skann kuren | BLINATUMOMAB | 56 µg | 240 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Blinatumomab 48 t | 048:00 t | 5 ml/t | 240 ml | | | |
| 01:01 | Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK | | | | | 000:00 t | 5 ml/t | | | | |
| 01:02 | Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t | | | | | 000:00 t | | | | | |

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 01:03 | Kontroller alle pumpeinnstillinger | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:04 | Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 5

Blinatumomab og ev. hydrering går kontinuerlig i separate løp.

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|--------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:10 | CADD-pumpe klargjøres etter prosedyre (se lenke i støtteinfo - les nøye) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:12 | Bruk sett med 0,2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:15 | Det skal ALDRI flushes i det lumen blinatum går, heller ikke ved posebytte | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:19 | Still kassettvolumet inn på 240 ml | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:55 | Infusjonsposen byttes 48 timer etter start dag 3. Restvolum kasseres. | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:00 | Skann kuren | BLINATUMOMAB | 56 µg | 240 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Blinatumomab 48 t | 048:00 t | 5 ml/t | 240 ml | | | |
| 01:01 | Koble til fylt CADD-sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK | | | | | 000:00 t | 5 ml/t | | | | |
| 01:02 | Kontroll av infusjonshastighet OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 5 ml/t | | | | | 000:00 t | | | | | |

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 01:03 | Kontroller alle pumpeinnstillinger | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 01:04 | Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Infusjonsposen byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 127c | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | JONAN 08-02-2022 14:39 | AG 08-02-2022 14:50 |
| Administrasjon | 0 | ANNMO 30-08-2022 10:03 | AG 30-08-2022 10:13 |