

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 02-04-2024 12:08)

(2<sup>e</sup> godkjenning 02-04-2024 12:09)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	056545	MESNA	1	360 mg/m <sup>2</sup>	N		IV post	N	N						1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17
<input type="checkbox"/>	2	023914	IFOSFAMD	1	1800 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N	3 time(r)	250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
<input type="checkbox"/>	3	021296	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt [fast]	N	N	2 time(r)		Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT:  Nei  B-Leukocytter:  Ja  B-Trombocytter:  Ja

P-Albumin:  Nei  P-Bilirubin:  Nei  P-Kreatinin:  Ja

Kalsium:  Nei  B-Nøytrofile granulocytter:  Ja  Kreatinin-clearance:  Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:  Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Ikke angitt

Kref i hjeme

Kref i hjeme 2

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	MESNA	
Infusjonsvæske:		
Adm-måte:	IV post	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	360 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum: 0 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:		

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

# Produksjon

Virkestoff: IFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 3 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 1800 mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 250 ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

# Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt [fast]**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped CNS 018a SIOP CNS GCT II Etoposid/ifosfamid over 1 år/10 kg

Kode: ped CNS 018a Emetogent potensiale: 3

Navn: SIOP CNS GCT II Etoposid/ifosfamid over 1 år/10 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	MESNA	1	360 mg/m <sup>2</sup>	IV post	N	N	
1;2;3;4;5;	2	IFOSFAMID	1	1800 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	3	ETOPOSID	1	100 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt [fast]	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 11-04-2024 08:21) (2<sup>e</sup> godkjenning 11-04-2024 08:25)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Hydrering til 24 timer etter siste avsluttet ifosfamidinfusjon		0:00	J	J

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Hydreringen starter minst 3 timer før start av ifosamid					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
03:05	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:10	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	360 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
03:15	Skann kuren	IFOSFAMID	1800 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
03:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfamid					000:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	002:00 t					
06:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
08:15	Ved avslutning etoposid: Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
08:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
Høyde	..... cm
Vekt	..... kg
Overflate	..... m <sup>2</sup>

**Dag 2**

**Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver - se støtteinfo.					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:07	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
03:10	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosfamid	MESNA	360 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
03:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 1	IFOSFAMID	1800 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
03:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfamid					000:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 1	ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	002:00 t					
06:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
08:15	Ved avslutning etoposid: Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
08:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
Høyde	..... cm
Vekt	..... kg
Overflate	..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver - se støtteinfo.					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:05	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:07	Dosekontroll av mesna iv					000:00 t					
03:10	Produseres på post. Gis iv umiddelbart før ifosamid	MESNA	360 mg/m <sup>2</sup>	0 ml	IV post	000:00 t					
03:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 2	IFOSFAMID	1800 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
03:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfamid					000:00 t					
06:10	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
06:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 2	ETOPOSID	100 mg/m <sup>2</sup>	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt [fast]	002:00 t					
06:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og etoposid					000:00 t					
08:15	Ved avslutning etoposid: Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
08:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

**Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urinstix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver - se støtteinfo.					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:11	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 3	IFOSFAMID	1800 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
03:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfamid					000:00 t					
06:15	Ved avslutning ifosfamid: Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
08:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
<b>Høyde</b>	..... cm
<b>Vekt</b>	..... kg
<b>Overflate</b>	..... m <sup>2</sup>

**Dag 5**

**Under cytostatikainfusjonene reduseres hastighet på hydrering slik at total væskemengde er uendret**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urin stix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver - se støtteinfo.					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
03:11	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
03:12	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:15	Skann kuren. Gis på samme tidspunkt som dag 4	IFOSFAMID	1800 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
03:16	Hydrering justeres: Total væskemengde 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:17	Kontroll av infusjonshastighet hydrering og ifosfarid					000:00 t					
06:15	Ved avslutning iforsfarid: Hydrering justeres til 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 6

**Hydrering til 24 timer etter siste avsluttet ifosfamidin fusjon**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Urinstix (kontakt lege ved blod 2+ eller over)					000:00 t					
00:01	Daglige blodprøver - se støtteinfo.					000:00 t					
00:09	Kontroll av tilsetning til hydreringsvæske					000:00 t					
00:10	Hydr tilsatt: MESNA 720 mg+KCl 20 mmol+NaCl 70 mmol+MgSO4 5 mmol /1000ml			Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Individuell infusjonshastighet: 125 ml/m <sup>2</sup> /time					000:00 t					
06:30	Avslutt hydrering 24 timer etter avsluttet ifosfamid-infusjon					000:00 t					
07:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

ped CNS 018a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 02-04-2024 12:08	mhell 02-04-2024 12:09
Administrasjon	0	tk 11-04-2024 08:21	mhell 11-04-2024 08:25